

ارزیابی اثرات کلرولاولگاریس در مقایسه با آرتی شوک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

دکتر بهمن طالبی پور^۱، دکتر مریم جامه شورانی^۲، دکتر رضا سلمانی^۳، دکتر حسین چیتی^۴

نویسنده‌ی مسؤول: زنجان، بیمارستان حضرت ولیعصر، مرکز تحقیقات متابولیک dr.shirinjameshorani@yahoo.com

دریافت: ۹۳/۴/۲۱ پذیرش: ۹۴/۴/۴

چکیده

زمینه و هدف: کبد چرب غیرالکلی، به عنوان یک مشکل عمده مرتبط با سلامت شناخته شده است در حال حاضر درمان‌های ثابت شده‌ای برای NAFLD وجود ندارد. با این حال طیف وسیعی از درمان‌های احتمالی پیشنهاد شده و مورد مطالعه قرار دارند در مطالعه جاری برآن شدیم تا اثرات درمانی مصرف دو عصاره کلرلا و آرتی شوک را در NAFLD مورد مقایسه قرار دهیم.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی ۹۰ بیمار با NAFLD ثابت شده با سونوگرافی و آزمایشات مربوطه وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی (پس از همسان سازی سنی، جنسی و BMI) به سه گروه دریافت کننده متفاوتین ویتامین E، مکمل کلرلا و آرتی شوک تقسیم شدند بعد از اتمام دوره‌ی درمانی، آنزیم‌های کبدی مجدد اندازگیری شد. کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تست‌های آماری آنالیز شدند.

یافته‌ها: میانگین سنی به همراه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، BMI و میانگین مقادیر آزمایشگاهی HDL AST ALT FBS CHOL TG LDL FBS در ابتدای مطالعه در هر سه گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما بعد از اتمام دوره‌ی درمانی تغییرات صورت گرفته در مقادیر AST ALT و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI در هر سه گروه خصوصاً گروه آلگومد، کاهش معنی داری نشان داد.

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر اثرات سودمندی از آرتی شوک و آلگومد در بیماران دچار کبد چرب نشان داد. پیشنهاد می‌کنیم مطالعات در آینده با حجم نمونه بیشتر به بررسی دقیق تر اثرات آرتی شوک و کلرولاولگاریس بر بیماری کبد چرب پردازد.

واژگان کلیدی: کلرولاولگاریس، کنکر کوهی، کبد چرب غیرالکلی

مقدمه

رو به افزایش خود کودکان و بزرگسالان را در گیر نموده و منجر به موربیدیتی قابل توجهی شده است. این بیماری

کبد چرب غیرالکلی یا NAFLD (Non Alcholic Fatty Liver Disease)

- ۱- فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، استادیار گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
- ۲- متخصص بیماری‌های داخلی، استادیار مرکز تحقیقات متابولیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
- ۳- پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
- ۴- فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم، استادیار گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کافی و متقاعد کننده نیست و نیازمند انجام کار آزمایی‌های بالینی می‌باشد (۱۵ و ۱۶). آرتیشوک حقیقی *Cynara Scolymus L* نامیده می‌شود که با آرتیشوک اسراپیلی *Tuberogus Helianthus* و نوع زاپنی *Stachys siclooldi Mig* متفاوت است (۱۵)، به علاوه در مطالعات اخیر نوعی جلبک تک سلولی بنام کلرلا (*Chlorella Vulgaris*) به عنوان منبع غنی از اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب ضروری، ویتامین‌ها به ویژه E، املاح و آنتی‌اکسیدان‌هایی نظیر بتاکاروتین مورد توجه قرار گرفته است (۱۶) اثرات گسترده‌ی فیزیولوژیک کلرلا از جمله تنظیم متابولیسم چربی-کربوهیدرات و پروتئین به اثبات رسیده است. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف روزانه‌ی این جلبک با نام تجاری *Algomed* می‌تواند در کاهش پیشرفت کبد چرب و بهبود آن موثر باشد (۱۷). ولی هیچ کدام از درمان‌های فوق اثبات نشده است، با توجه به اهمیت و شیوع روز افزون بیماری کبد چرب و اینکه تاکنون این دو داروی جدید پیشنهادی در ایران مورد کارآزمایی قرار نگرفته است و اثرات آن‌ها با داروی استاندارد متغور مین و ویتامین E مقایسه نشده است، در مطالعه جاری برآن شدیم تا اثرات درمانی مصرف دو عصاره‌ی کلرلا و آرتیشوک را در NAFLD در جمعیت بیماران کبد چرب مورد مقایسه قرار دهیم.

روش بررسی

مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی بود. در کمیته‌ی اخلاق دانشگاه تایید و در کارآزمایی بالینی کشور با کد NAFLD ۱۹۵۵۴IRCT ۲۰۱۴۱۰۱۶۱۹ ثبت شد. بیماران با BMI بین ۲۵ تا ۳۵ با اخذ رضایت نامه‌ی کتبی وارد مطالعه شدند.

تعريف NAFLD: افزایش ۱/۵ تا ۵ برابر آنزیم‌های کبدی منطبق با معیارهای سونوگرافی و بعد از رد کردن سایر علل

در دهه‌های اخیر به یکی از علل اصلی بیماری‌های کبدی در کشورهای صنعتی تبدیل شده است (۱) در سیر بیماری NAFLD چربی در کبد رسوپ می‌کند (استئاتوز) که این واقعه ارتباطی به مصرف بیش از حد الكل ندارد. بلکه در رابطه با سندروم متابولیک (چاقی-هیپرلیپیدمی)- مقاومت به انسولین و فشارخون بالا) قرار می‌گیرد (۲). NAFLD ممکن است نهایتاً منجر به سیروز، کارسینوم هپاتوسلولار و مرگ گردد (۴). در حال حاضر درمان‌های ثابت شده‌ای برای NAFLD وجود ندارد. با این حال طیف وسیعی از درمان‌های احتمالی پیشنهاد شده و مورد مطالعه قرار دارند. اگرچه بسیاری از این درمان‌ها باعث کاهش سطح مارکرهای سرمی آسیب کبدی مانند الانتوئین ترانسفرازها می‌شوند ولی اکثریت آن‌ها نمی‌توانند اختلالات بافت‌شناسی را تغییر دهد (۵). از جمله درمان‌های نسبتاً موثر شناخته شده می‌توان به رژیم غذایی (۵) کاهش وزن بدن (۶) حساسگرها انسولین مانند متغور مین (۶) و تیازولیدین دیونها (۸) اشاره کرد. مصرف ویتامین E نیز اثر مثبتی در بهبود نتیجه بالینی نشان داده است (۹)، اغلب افراد دچار کبد چرب مبتلا به سندروم متابولیک نیز می‌باشند و استفاده از یک کاهنده چربی خون می‌تواند نقش مفیدی در درمان موربیدیتی‌های همراه سندروم متابولیک و دیس لیپیدمی داشته باشد (۱۰). مواد جدیدی در درمان NAFLD مورد مطالعه قرار گرفته دارند. که از آن جمله می‌توان به آلیگوفروکتوز موجود در برخی گیاهان از جمله سیر، پیاز، کنگر کوهی و اشاره کرد. در مطالعات بر روی موش‌های صحرایی نشان داده شده است که تامین فروکتوز اثر کاهنده‌ی بر تری‌گلیسرید سرمی و کبدی از طریق کاهش در لیپوژنر کبدی دارد (۱۱) در مطالعه‌ای دیگر تجویز آلیگوفروکتوز در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی منجر به کاهش آمینو ترانسفرازها و سطوح انسولین گردیده است (۱۲) عصاره‌ی برگ کنگر کوهی (ALE) اثرات خوبی در کاهش سطوح کلسترول نشان داده است. گرچه شواهد موجود هنوز

شام و ویتامین E ۴۰۰ واحدی ساخت شرکت اکسیردارو یک بار در روز بعد از ناهار دریافت کردند.

۲- گروه دوم مکمل کلرلاساخت شرکت الگومد سه بار در روز ۲ ساعت بعد از غذای رژیم نمودند.

۳- گروه سوم مکمل کنگر کوهی ساخت شرکت الگومد دو بار در روز ۲ ساعت بعد از غذا دریافت کردند.

کلیه بیماران قبل از شروع رژیم دارویی به کارشناس تغذیه ارجاع داده شدند تا توضیحات و اطلاعات لازم درباره مقدار انرژی و فعالیت روزانه و نحوه پر کردن پرسشنامه‌ی فعالیت فیزیکی و تغذیه جهت اندازه‌گیری مقدار انرژی مصرفی روزانه و مقدار فعالیت بدنی انجام گرفته داده شود. قبل از شروع مطالعه و پس از گذشت هشت هفته از شروع درمان سطح سرمی ALT در یک آزمایشگاه سنجیده شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص‌های مرکزی و پراکندگی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای مقایسه متغیر کمی از تست Indeoendent T-Test (در صورت توزیع نرمال) و تست Mann-Withney (در صورت توزیع غیر نرمال) و برای متغیرهای کیفی از تست Chi-Square استفاده شد انجام آزمایشات و گرفتن خون با رضایت آگاهانه افراد و کتسی شرکت کنندگان بود هیچ گونه مداخلات درمانی خارج از روال روتین، صورت نگرفت و بیماران هیچ هزینه‌ای را در این طرح پرداخت نکردند. بیماران از نظر عوارض دارویی نیز بررسی شدند و تأکید شد که در صورت بروز عارضه‌ای در اسرع وقت اطلاع داده شود.

یافته‌ها

در این مطالعه ۹۰ بیمار مبتلا به کبد چرب غیرالکلی در سه گروه ۳۰ نفره شرکت کردند. میانگین و انحراف معیار سن افراد در گروه اول (گروه دریافت کننده متفورمین و ویتامین E) 10 ± 38 سال، در گروه دوم (گروه دریافت

ثانویه افزایش آنزیم‌های کبدی و بیماری‌های کبدی (۱). معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از:

- بیماران مبتلا به استئاتوھپاتیت الكلی - بیماران مبتلا به بیماری‌های سیستمیک مانند دیابت-

بیماری‌های التهابی و ...

- سرولوژی مثبت و برال هپاتیت (به روش الیزا و با دستگاه الیزارد شرکت Stat Fax)

- ANA, AMA مثبت (به روش الیزا و با دستگاه الیزارد شرکت Stat Fax)

- سرولوپلاسمین مثبت (به روش الیزا و با دستگاه الیزارد شرکت Stat Fax)

- سایر علل ثانویه کبد چرب با توجه به یکی از درمان‌های رایج و تایید شده کبد چرب

که متفورمین و ویتامین E می‌باشد و اثرات اثبات شده‌ی آن‌ها و به علت اخلاق پژوهش که نمی‌توان یک گروه را بدون درمان به عنوان گروه کنترل به مدت ۲ ماه تحت نظر گرفت، ما در این پژوهش بر آن شدیم تا گروه کنترل تحت درمان استاندارد و نه پلاسبو باشد و اثرات درمانی دو داروی جدید پیشنهادی با آن مقایسه شود.

در این مطالعه ۹۰ بیمار مبتلا به کبد چرب (معیار سونوگرافی و آنزیم‌های افزایش یافته کبدی) وارد مطالعه شدند و طبق مطالعات مشابه انجام شده و محاسبه آماری و مهم‌تر از همه هزینه محدود پژوهشی به سه گروه ۳۰ نفره تقسیم شدند و به مدت ۲ ماه تحت بررسی قرار گرفتند. در ابتدای مطالعه وزن (با ترازوی عقریه‌ای) و قد (با متر نواری) کلیه بیماران در حالی که بیمار ایستاده و به دیوار تکیه داشتند اندازه‌گیری BMI محاسبه شد. در ادامه، بیماران پس از Matching سنی، جنسی و به لحاظ BMI به سه گروه تقسیم شدند:

۱- گروهی به عنوان کنترل تنها درمان متفورمین ۵۰۰ میلی‌گرمی ساخت شرکت اکسیردارو دو بار پس از صبحانه و

AST و میانگین مقادیر آزمایشگاهی BMI، ALT، FBS، CHOL، TG، LDL، HDL و FBS در ابتدای مطالعه در میان هر سه گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت ($P \geq 0.05$) (جدول ۱).

آلگومد) 35 ± 7 سال و در گروه سوم (گروه دریافت کننده آرتی شوک) 38 ± 8 سال بود درصد ریزش بیماران در هر گروه طی مدت پیگیری صفر درصد بود. میانگین سنی به همراه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک،

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار اولیه مشخصات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مورد مطالعه

متغیر	گروه ۱ ± میانگین	گروه ۲ ± میانگین	گروه ۳ ± میانگین	P-value
سن (kg/m ²) BMI	38 ± 10	35 ± 7	38 ± 8	0.4
فشار خون سیستولیک mmHg	27 ± 4	26 ± 3	27 ± 3	0.5
فشار خون دیاستولیک mmHg	126 ± 12	125 ± 10	125 ± 10	0.9
(mg/dl) ALT	79 ± 10	80 ± 9	82 ± 9	0.4
(mg/dl) AST	45 ± 12	61 ± 30	70 ± 30	0.06
(mg/dl) HDL	47 ± 7	51 ± 12	56 ± 22	0.2
(mg/dl) LDL	109 ± 30	109 ± 28	97 ± 28	0.2
(mg/dl) TG	151 ± 32	164 ± 35	143 ± 37	0.1
(mg/dl) CHOL	197 ± 37	188 ± 50	186 ± 29	0.5
(mg/dl) FBS	94 ± 15	107 ± 20	88 ± 12	0.06

متغورمین و ویتامین E در گروه آلگومد 22 ± 7 و در گروه آرتی شوک 13 ± 7 کاهش نشان داد (جدول ۳) و در نهایت مقایسه‌ی صورت گرفته میان میانه‌ی تغیرات در بین سه گروه نشان داد که هیچ تفاوت معنی داری بین میانه‌ی تغیرات فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، ALT و BMI وجود ندارد ($P \geq 0.05$) (جدول ۳).

اما بعد از اتمام دوره‌ی درمانی نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین و انحراف معیار AST و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI در تمام گروه‌ها تغییر کرد که در جدول ۲ نشان داده شده است. آنالیزها نشان داد تغیرات صورت گرفته در مقادیر ALT و AST و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI در هر سه گروه و در قبل و بعد درمان تفاوت آماری معنی داری داشت یعنی در انتهای مطالعه در هر سه گروه به طور معنی داری در وزن و فشارخون و مقادیر AST/ALT کاهش قابل توجه دیده شد. به عنوان مثال میانگین مقدار ALT در گروه

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار متغیرهای اندازه‌گیری شده در پایان مطالعه و مقدار تغییرات صورت گرفته در قبل و بعد درمان در هر یک از گروه‌های مورد مطالعه

متغیر	قبل درمان		بعد درمان		میانگین \pm SD		P	میانگین \pm SD
	گروه ۱	گروه ۲	گروه ۱	گروه ۳	گروه ۲	گروه ۳		
فشارخون سیستولیک mmhg	۱۲۶ \pm ۱۲	۱۲۵ \pm ۱۵	۱۱۷ \pm ۲۰	۱۱۸ \pm ۱۲	۱۲۰ \pm ۸	۰/۰۴		
فشارخون دیاستولیک mmhg	۷۹ \pm ۱۰	۸۰ \pm ۹	۷۴ \pm ۹	۷۴ \pm ۸	۷۷ \pm ۷	...		
ALT	۶۷ \pm ۲۱	۷۶ \pm ۳۰	۴۷ \pm ۱۶	۵۶ \pm ۲۶	۵۳ \pm ۲۶	۰/۰۰۲		
AST	۴۵ \pm ۱۲	۶۱ \pm ۳۰	۳۶ \pm ۱۱	۴۲ \pm ۲۰	۴۱ \pm ۱۷	...		
BMI	۲۷ \pm ۴	۲۶ \pm ۳	۲۶/۵ \pm ۴	۲۵/۳ \pm ۳	۲۶/۱ \pm ۳	...		

جدول ۳: مقایسه میانه تفاوت تغییرات بعد درمان در میان سه گروه مورد مطالعه

متغیر	میانه تفاوت تغییرات بعد درمان			P-value
	گروه ۱	گروه ۲	گروه ۳	
mmHg	۵	۷/۵	۵	۰/۴
mmHg	۵	۱۰	۶	۰/۷
ALT	۱۹	۲۲	۱۳	۰/۴
AST	۹/۶	۱۹/۶	۱۵	۰/۰۶
BMI	۰/۵	۱/۱	۱	۰/۱

معنی داری داشت^{*} به طوری که میانگین مقدار ALT در گروه متفورمین و ویتامین E، در گروه آلگومد ۳۱ و در گروه آرتی شوک ۲۸ بود که حاکمی از کاهش میزان ALT در این گروه‌ها بود. نتایج سایر مطالعات نیز حاکمی از اثرات مفید این داروهاست. به طور مثال در مطالعه دایبول در سال ۲۰۰۵ بعد از پایان ۸ هفته مشاهده شد که الیگروفوکوز به طور معنی داری باعث کاهش AST و ALT شد (۱۲) پناهی و همکاران در سال ۲۰۱۰ طی یک کارآزمایی بالینی اثر افزودن کلرولاولگاریس به رژیم درمانی NAFLD با متفورمین و ویتامین E را بررسی کردند. پس از سه ماه از رژیم درمانی

بحث استفاده از داروهای گیاهی یکی از گزینه‌های درمانی می‌باشد که مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این مطالعه نیز ما با هدف بررسی اثر درمانی دو رژیم گیاهی آرتی شوک و کلرولاولگاریس (آلگومد) یک کارآزمایی بالینی را بر روی ۹۰ بیمار مبتلا به کبد چرب غیرالکلی انجام دادیم. نتایج ما اثرات مشتبی از این دو دارو در مقایسه با متفورمین و ویتامین E نشان داد به طوری که بعد از اتمام دوره‌ی درمانی نتایج به دست آمده نشان داد که که میانگین و انحراف معیار AST و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک کاهش

این نکته بود که متسافانه به دلیل عدم همکاری کامل بیماران و محدودیت‌های بودجه‌ای نتوانستیم در پایان مطالعه پروفایل چربی و سطوح قند خون بیماران را به دست آوریم، بنابراین سنجش اثرات داروهای مورد استفاده در این مطالعه بر متغیرهای ذکر شده میسر نشد.

نتیجه گیری

مطالعه‌ی حاضر هم راستا با اکثر مطالعات مشابه قبلی اثرات سودمندی از آرتی شوک و آلگومد در بیماران دچار کبد چرب نشان داد. لذا پیشنهاد می‌شود مطالعاتی با حجم نمونه‌ی بیشتر به بررسی دقیق تر اثرات آرتی شوک و کلرولگاریس بر بیماری کبد چرب و همچنین بر وضعیت پروفایل چربی و قند خون و انسولین انجام شود.

تقدیر و تشکر

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به جهت تامین مالی این طرح و از سرکار خانم دکتر سعیده مظلومزاده به خاطر آنالیز آماری کمال تشکر را داریم.

References

- MK Oh, Winn F. Diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease. *Aliment Pharmacol Ther.* 2008; 28: 503-22.
- Adams LA, Angulo P. "Treatment of non-alcoholic fatty liver disease". *Postgrad Med J.* 2006; 82: 315-22.
- Clark JM, Diehl AM. "Nonalcoholic fatty liver disease: an underrecognized cause of cryptogenic cirrhosis". *JAMA.* 2003; 289: 3000-4.
- Adams LA, Waters R, Knuiman M, et al. NAFLD as a risk factor for the development of diabetes and the metabolic syndrome: An eleven-year follow-up study. *Am J Gastroenterol.* 2009; 104: 861-67.
- Huang MA, Greenson JK, Chao C, et al. One-year intense nutritional counseling results in histological improvement in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a pilot study. *Am J Gastroenterol.* 2005; 100: 1072-81.
- Bugiaresi E, Gentilcore E, Manini R, et al. A randomized controlled trial of metformin versus vitamin E or prescriptive diet in nonalcoholic fatty liver disease. *Am J Gastroenterol.* 2005; 100: 1082-90.
- Duseja A, Das A, Dhiman R, et al. "Metformin

وزن، BMI، شاخص HOMA-IR به همراه سطوح سرمی ALP AST ALT HBAlc، انسولین، بیلر و بین توtal و مستقیم، اسید اوریک، آلبومین و لیپید پروفایل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این کارآزمایی حاکی از آن بود که افروزن عصاره‌ی کلرولگاریس به رژیم درمانی متفسور مین و ویتامین E اثرات مطلوبی در سطح سرمی ترانس آمینازها و تری‌گلیسیریدها علاوه بر حساسیت به انسولین مشاهده گردید (۱۸). در برخی مطالعات، دیگر اثرات این داروها بر پروفایل چربی بررسی شده، از جمله در پژوهش پیتلر و همکاران که در سال ۲۰۰۲ با هدف بررسی اثرات آرتی شوک بر پروفایل چربی انجام شد. این بررسی مجموعاً ۱۶۷ بیمار مبتلا به هیپر لیپیدمی را شامل می‌شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از آرتی شوک در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری سطح کلسترول تام را کاهش می‌دهد (۱۹). در مطالعه‌ی متانالیز دیگر توسط وايدر نتیجه‌ای مشابه همین مطالعه گزارش شد (۱۳) کاپاسو (۲۰)، آرتمنر (۲۱)، سانو (۲۲) چمگ (۲۳) هم اثرات معنی داری از کلرا و آرتی شوک در کاهش کلسترول تام گزارش کردند. نکته‌ی قابل ذکر در مطالعه‌ی ما

- is effective in achieving biochemical response in patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) not responding to lifestyle interventions". *Annals of Hepatology*. 2007; 6: 222-26.
- 8- Belfort R, Harrison SA, Brown K, et al. "A placebo-controlled trial of pioglitazone in subjects with nonalcoholic steatohepatitis". *N Engl J Med*. 2006; 355: 2297-307.
- 9- Sanyal AJ, Chalasani N, Kowdley KV, et al. "Pioglitazone, vitamin E, or placebo for nonalcoholic steatohepatitis". *N Engl J Med*. 2010; 362: 1675-85.
- 10- Agheli N, Kabir M, Berni-Canani S, et al. Plasma lipids and fatty acids synthase activity are regulated by short chain fructooligosaccharides in sucrose-fed insulin-resistant rats. *J Nutr*. 1998; 128: 1283-8.
- 11- Kok N, Roberfroid M, Robert A, Delzenne NM. Involvement of lipogenesis in the lower VLDL secretion induced by oligofructose in rats. *Br J Nutr*. 1996; 76: 881-90.
- 12- Daubioul CA, Horsman Y, Lambert P, Danse E, Delzenne NM. Effects of oligofructose on glucose and lipid metabolism in patients with nonalcoholic steatohepatitis: results of a pilot study. *Eur J Clin Nutr*. 2005; 5; 1: 723-6.
- 13- Wider B, Pittler MH, Thompson-Coon J, Ernst E. Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolaemia. (Cochrane Review). In: The Cochrane Libm. y2009, Issue 4. Oxford: Update Software.
- 14- Bundy R, Waker AF, Middeton RW, et al. Artichoke leaf extract reduces plasma cholesterol in otherwise healthy hypercholesterolemic adults. 2008; 15: 668-75.
- 15- De Vos, Neal E. Artichoke Production in California, HcrTechno/ogy. 1992; 2: 438-444.
- 15- Mizoguchi T, Takeharo I, Masuzawa T, et al. Nutrigenomic studies of effects of chlorella on subjects with high-risk factors for life style related diseases. 2008; 11: 395-405.
- 16- Suzuki A, Lindor K, St Saver J, et al. Effect of changes on body weight and lifestyle in nonalcoholic fatty liver disease. *J Hepatology*. 2005; 43: 1060-66.
- 17- LC Wu, JA Annie Ho, et al. Antioxidant and antiproliferative activities of spirulina and chlorella water extracts. 2005; 53: 4207-12.
- 18- Panahi Y. (2010) Abstracts of papers, third international Tehran hepatitis congress, Tehran; congress abstract book; abstract. 035.
- 19- Pittler MH, Thompson Coon J, Ernst E. Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolaemia (Cochrane Review). In: *Cochrane Database Syst Rev*. 2002; (3): CD003335.
- 20- Capasso F, Gagnella TS, Grandolini G, Izzo AA. Phytotherapy: A Quick Reference to Herbal Medicine. Berlin: Springer. 2003.
- 21- Artner-Dworzak E, Mayr a, Mueller B, Maly K, Grunicke H. (2000) Influence of the artichoke extract on lipid metabolism. *Phytomedicine*; Supplement. 11: 46 SL-91.

- 22- Sano T, Tanaka Y. (1987) Effect of dry, powdered chlorella vulgaris on experimental atherosclerosis and alimentary hyperchlorestolemia in cholesterol-led rabbits. *Artery*. 1987; 14: 76-84.
- 23- Chemg JY, Shih MF. (2005) preventing dyslipidemia by *chlorella pyrenoidosa* in rats and hamsters after chronic fat diet treatment. *Life Sciences*. 13; 76: 3001-13.

www.ALGOMED.ir

The Effect of *Chlorella Vulgaris* vs. Artichoke on Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD): A Randomized Clinical Trial

Talebi Pour B¹, Jameshorani M², Salmani R¹, Chiti H¹

¹Dept.of Internal Medicine,Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

²Zanjan Metabolic Disease Research Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Corresponding Author: Jameshorani M, Zanjan Metabolic Disease Research Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

E-mail: dr.shirinjameshorani@yahoo.com

Received: 12 Jul 2014 **Accepted:** 25 Jun 2015

Background and Objective: Non-alcoholic fatty liver disease has been identified as a major health -related problem. There is no proven therapy for NAFLD. However, a number of possible treatments have been proposed and studied. The aim of this study was to evaluate the therapeutic effects of both *Chlorella Vulgaris* and Artichoke leaf extracts on NAFLD.

Materials and Methods: In this clinical trial study, 90 patients with NAFLD participated and randomly allocated to three groups. After initial examination, lipids and liver enzymes were measured. The groups received Metformin, *Chlorella* supplements and Artichoke. After the therapeutic period, liver enzymes were measured again. All collected data were analyzed using SPSS software and independent T-Test, Mann-Whitney and Chi-Square tests.

Results: At baseline, mean age, systolic and diastolic blood pressure, BMI, ALT, AST, HDL, LDL, TG, CHOL and FBS showed no significant difference in three groups. But, after the completion of the treatment, serum ALT, AST, systolic and diastolic blood pressure and BMI significantly decreased in all three groups.

Conclusion: Our study showed the beneficial effects of Artichoke and *Chlorella vulgaris* in patients with NAFLD. We suggest future studies be performed with larger sample sizes for precise evaluation of the effects of Artichoke and *Chlorella vulgaris* on NAFLD.

Keyword: *Chlorella vulgaris*, Artichoke NAFLD, randomized clinical trial